

Question 1

À l'aide du modèle de chaîne de transmission, expliquez comment une infection respiratoire est transmise à un fournisseur de soins en milieu de soins en associant les éléments qui suivent. Inscrivez la lettre (p. ex. A, B, C) correspondant à votre choix dans la case.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> D Agents infectieux | A. Toux et éternuements |
| <input type="checkbox"/> F Réservoir | B. Yeux, nez, bouche |
| <input type="checkbox"/> A Porte de sortie | C. Mains et surfaces contaminées |
| <input type="checkbox"/> C Mode de transmission | D. Virus de l'influenza |
| <input type="checkbox"/> B Porte d'entrée | E. Personnes n'ayant pas reçu leur vaccin annuel contre la grippe |
| <input type="checkbox"/> E Hôte sensible | F. Poumons et conduits respiratoires du client/patient/résident |

Question 2

Une aide ménagère portant des gants nettoie et désinfecte le plancher où de petites gouttes de sang sont tombées. Avec ces mesures, quel(s) maillon(s) de la chaîne de transmission brise-t-on? Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « ✓ » la case appropriée.

- A. Agents infectieux
- B. Réservoir
- C. Porte de sortie
- D. Mode de transmission
- E. Porte d'entrée
- F. Hôte sensible

Question 3

Que devriez-vous faire en premier avant SOIT de soigner la plaie d'un client/patient/résident SOIT de nettoyer son environnement? Cochez « ✓ » la case appropriée.

- A. Effectuer une évaluation du risque
- B. Nettoyer le chariot
- C. Rassembler l'équipement et le matériel
- D. Document admission history

Question 4

Quelles questions sont pertinentes lorsque vous effectuez une évaluation du risque individuel? Cochez « ✓ » la case appropriée. Sélectionnez *tous* les éléments pertinents.

- A. Suis-je habile à cette tâche?
- B. Mon client/patient/résident est-il coopératif?
- C. Comment mon superviseur évaluera-t-il mon travail?
- D. Est-ce que mon client/patient/résident a des écoulements incontrôlés?

Question 5

Laquelle ou lesquelles des activités suivantes peuvent diminuer la transmission des agents infectieux? Cochez « ✓ » la case appropriée. Sélectionnez *tous* les éléments pertinents.

- A. Un fournisseur de soins de santé nettoie le matériel commun.
- B. Un fournisseur de soins de santé enlève un pansement souillé et le met directement à la poubelle.
- C. Un fournisseur de soins de santé trie les produits de nettoyage dans l'armoire où ils sont entreposés.
- D. Un fournisseur de soins de santé enlève ses gants pour donner un médicament au résident.

Commentaires supplémentaires

Question 1

La transmission de l'influenza se produit lorsque le virus de l'influenza (agent infectieux) vit et se développe dans les poumons et les conduits respiratoires du client, du patient ou du résident (réservoir), sort lorsque la personne tousse et éternue (porte de sortie), se transmet par les mains, les surfaces et les gouttelettes (mode de transmission) et s'introduit par les yeux, le nez et la bouche (porte d'entrée) chez un hôte sensible.

Question 2

On brise la chaîne en :

- Portant des gants pour empêcher l'agent potentiellement infectieux de pénétrer la peau de l'aide ménagère par des coupures ou des éraflures (porte d'entrée)
- Nettoyant et désinfectant le plancher pour éliminer l'agent potentiellement infectieux (sang), ce qui bloque le mode de transmission (contact)

La personne dont le sang est sur le plancher était le réservoir et la porte de sortie. Ils ne sont pas dans ce scénario. Toute personne est un hôte sensible si elle est exposée au sang de quelqu'un d'autre. L'aide ménagère utilisait des gants et n'a pas touché au sang.

Question 3

Effectuer une évaluation du risque est la première chose à faire avant d'effectuer toute tâche dans un milieu de soins. Rassembler l'équipement et le matériel est nécessaire, mais ce n'est pas la première chose à faire. Nettoyer le chariot et informer votre superviseur n'est pas ce que vous devez faire en premier.

Question 4

Lorsque vous effectuez une évaluation du risque individuel, vous devez vous concentrer sur trois points principaux : la tâche que vous allez faire; ce que vous savez à propos de votre client/patient/résident et ce que vous savez sur les mesures de protection en place. Il est pertinent de vous demander quel est votre niveau d'habileté dans la tâche à effectuer. S'il s'agit de la première fois que vous appliquez une procédure, il vous faudra peut-être demander de l'aide pour vous assurer qu'elle est suivie en toute sécurité. En évaluant l'état physique et cognitif (mental) de votre client/patient/résident, cela vous aide à décider si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou de protection individuelle pour effectuer la tâche. Comment votre superviseur évalue votre travail n'est certainement PAS la bonne question à se poser dans une évaluation du risque individuel.

Question 5

Nettoyer le matériel commun et jeter les pansements souillés réduit le risque de transmission des infections. Trier les produits ne réduit pas le risque de transmission des infections. Enlever ses gants et ne pas se laver ou se désinfecter les mains peut augmenter le risque de transmission des infections.